

# Echelle de Bristol<sup>1</sup>

Peristeen® Plus

Type de selles	Description
	<p>1 Morceaux durs en forme de billes détachées (difficiles à évacuer). Comme des crottes de lapin.</p> 
	<p>2 Billes collées les unes aux autres, en gros morceaux (durs et piquantes). Ça pique comme un hérisson.</p> 
	<p>3 Selles de formes longues, avec des bosses superficielles (faciles à évacuer). Elles filent comme la souris.</p> 
	<p>4 Longues et lisses (faciles à évacuer). Comme la queue du chat.</p> 
	<p>5 Selles molles, petites masses faciles à évacuer (passent sans douleur). Elles ressemblent au crottin de cheval.</p> 
	<p>6 Morceaux pelucheux, en bouillie. On dirait de la bouse de vache. Ce n'est pas une diarrhée.</p> 
	<p>7 Selles complètement liquides sans morceau solide. Comme de l'eau, tu as la diarrhée.</p> 

## > PGI-S : Une question simple pour évaluer la sévérité des troubles colorectaux en 5 secondes <sup>2, 3</sup>

**PGI-S**  
Patient Global Impression of Severity

Comment estimez-vous la gêne liée à vos troubles colorectaux ?\*

\* Constipation, fuites fécales, difficultés à l'évacuation...

Absence de gêne

Gêne légère

Gêne modérée

Gêne sévère

Coloplast

En cas de gêne modérée à sévère, pour réadapter le traitement, poser au minimum ces quelques questions :

- Avez-vous moins de 3 épisodes de selles par semaine ?
- Avez-vous des selles dures (score 1 ou 2 sur l'échelle de Bristol) ?
- Avez-vous des pertes de selles ?
- Avez-vous des difficultés et des besoins de pousser pour aller à la selle ?
- Avez-vous des pertes d'urines intempestives ou avez-vous plus de 3 épisodes d'infections urinaires par an ?

## Une question sur les irrigations transanales ?

Contactez notre Service Relation Utilisateurs au

**0 800 01 58 68** Service & appel gratuits

Réglette disponible auprès de votre représentant Coloplast

1- Lewis SJ, Heaton KW. Stool form scale as a useful guide to intestinal transit time. Scand J Gastroenterol. 1997 Sep;32(9):920-4.

2- Yalcin I, Bump RC. Validation of two global impression questionnaires for incontinence. Am J Obstet Gynecol. 2003 Jul;189(1):98-101. PubMed PMID: 12861145.

3- Previnère JG, Soler JM. Sévérité des troubles colorectaux en CRF et évaluation de la gêne à l'aide du PGI-S. Enquête menée en 2014 dans 2 centres (Calvé-fondation Hopale et Bouffard-Vercellj) auprès des patients présentant une lésion neurologique chronique (> 2 mois) et présents depuis plus d'une semaine en centre. 169 patients inclus.

Soins des stomies / Continence / Soins des plaies / Urologie interventionnelle

Laboratoires Coloplast - SAS : Société par actions simplifiée  
Siège social : Les Jardins du Golf - 6 rue de Rome - 93561 Rosny sous bois CEDEX - France  
Capital social : 22 001 980 Euros - RCS BOBIGNY : 312 328 362 - SIREN : 312 328 362  
SIRET : 312 328 362 00040 - CODE NAF (ex APE) : 4646Z - N° TVA Intracommunautaire : FR 18 312 328 362

Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK - 3050 Humlebaek.  
© Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast - Réf. 2796P - Février 2022 - PA

 **Coloplast**